

# ZONNEWIJZERS


## Hoofdstuk 13 De cirkel van Lambert

Inhoud:

Inleiding	blz. 13.1
Constructie van de cirkel	blz. 13.1
Een vraag	blz. 13.2
Gebruikte formules uit de hoofdstukken 1 en 12	blz. 13.2
Berekening van de straal en het middelpunt	blz. 13.2
Bewijs dat het punt van opkomst ook op de cirkel van Lambert ligt	blz. 13.2

### Inleiding

Met de Cirkel van Lambert kan bij de Analematische Zonnewijzer de tijd van zonsopkomst (en -ondergang) geconstrueerd worden.



### Constructie van de cirkel

- Teken de lijn FM
- Het midden van FM is punt H
- Teken door H de middenloodlijn van lijnstuk FM
- Deze lijn snijdt de korte as van de ellips in K
- Teken een cirkel met straal KM (of KF)
- Het snijpunt van deze cirkel met de ellips, punt L, geeft het tijdstip van zonsopkomst en zonsondergang.

# ZONNEWIJZERS

## Een vraag

In onderstaande wordt de juistheid hiervan aangetoond. Wel blijft de vraag WAAROM deze cirkel deze tijden aangeeft. Volgt dit uit de projectie waarmee de analematische zonnwijzer wordt gemaakt? Graag ontvang ik de gouden tip. Het is bijvoorbeeld wel logisch dat de cirkel op 21 maart en 23 september overgaat in een rechte lijn van 6 naar 18 uur.

## Gebruikte formules uit de hoofdstukken 1 en 12

Bij gegeven lange as =  $l$  en geografische breedte =  $b$  is bij elke uurhoek =  $P$  een punt op de ellips te bepalen:

$$x = l \cdot \sin(P) \text{ en } y = l \cdot \sin(b) \cdot \cos(P)$$

Voor het brandpunt (F) geldt:

$$FA = l \cdot \cos(b)$$

Hoek vanuit F naar lijnstuk A-Persoon Hoek (AFM) = declinatie

Voor een persoon (M) op een bepaalde datum geldt:  $AM = Y_M = l \cdot \tan(d) \cdot \cos(b)$

De uurhoek bij opkomst volgt uit (zie Hoofdstuk 1):  $\cos(P_{\text{opk}}) = -\tan(b) \cdot \tan(d)$

## Berekening van de straal en het middelpunt

Om de straal van de cirkel te berekenen wordt eerst de lengte van FP berekend.

$$\cos(\text{AFM}) = \cos(d) = \left| \frac{FA}{FM} \right| \rightarrow FM = \left| \frac{FA}{\cos(d)} \right| = \left| \frac{l \cdot \cos(b)}{\cos(d)} \right|$$

$$MH = \left| \frac{FM}{2} \right| = \left| \frac{l \cdot \cos(b)}{2 \cdot \cos(d)} \right|$$

$$|\sin(\text{HKM})| = |\sin(d)| = \left| \frac{MH}{KM} \right| = \left| \frac{MH}{R} \right| \text{ zodat}$$

$$R = |KM| = \left| \frac{MH}{\sin(d)} \right| = \left| \frac{l \cdot \cos(b)}{2 \cdot \sin(d) \cdot \cos(d)} \right| = \left| \frac{l \cdot \cos(b)}{\sin(2 \cdot d)} \right| \text{ of } R = \left| \frac{FA}{\sin(2 \cdot d)} \right|$$

$$y_K = AK = KM - AM = \frac{l \cdot \cos(b)}{\sin(2 \cdot d)} - l \cdot \tan(d) \cdot \cos(b) = \frac{l \cdot \cos(b)}{2 \cdot \sin(d) \cdot \cos(d)} - \frac{l \cdot \sin(d) \cdot \cos(b)}{\cos(d)}$$

$$= \frac{l \cdot \cos(b) - l \cdot \sin(d) \cdot \cos(b) \cdot 2 \cdot \sin(d)}{2 \cdot \sin(d) \cdot \cos(d)} = \frac{l \cdot \cos(b)}{\sin(2 \cdot d)} \cdot (1 - 2 \cdot \sin^2(d)) = \frac{l \cdot \cos(b)}{\sin(2 \cdot d)} \cdot \cos(2 \cdot d) =$$

$$= \frac{l \cdot \cos(b)}{\tan(2 \cdot d)} \text{ met } l \text{ en } b \text{ positief en } d < 0 \text{ is } y_K > 0 \text{ zodat: } y_K = -\frac{l \cdot \cos(b)}{\tan(2 \cdot d)}$$

## Bewijs dat het punt van opkomst ook op de cirkel van Lambert ligt


Als punt  $(x_p, y_p)$  bij opkomst op de cirkel van Lambert ligt, dan moet dit punt voldoen aan de vergelijking van de cirkel  $x_p^2 + (y_p - y_K)^2 = R^2$ , of

$$l^2 \cdot \sin^2(P_{\text{opk}}) + (l \cdot \sin(b) \cdot \cos(P_{\text{opk}}) - (-\frac{l \cdot \cos(b)}{\tan(2 \cdot d)}))^2 = (\frac{l \cdot \cos(b)}{\sin(2 \cdot d)})^2$$

De uurhoek bij opkomst wordt bepaald door  $\cos(P_{\text{opk}}) = -\tan(b) \cdot \tan(d)$  (zie Hoofdstuk 1)

# ZONNEWIJZERS

Fig. 13.1



$$BC^2 = AC^2 - AB^2 = \cos^2(b) \cdot \cos^2(d) - \sin^2(b) \cdot \sin^2(d)$$

$$\text{zodat: } \sin^2(P_{\text{opk}}) = \frac{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d) - \sin^2(d) \cdot \sin^2(b)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)}$$

Als de formule voor  $\sin^2(P_{\text{opk}})$  herleid uit de vergelijking van de cirkel hier gelijk aan is, dan ligt het punt van opkomst inderdaad op de cirkel van Lambert.

In het volgende is  $P = P_{\text{opk}}$

$$l^2 \cdot \sin^2(P) + l^2 \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(P) + \frac{2 \cdot l \cdot \sin(b) \cdot \cos(P) \cdot l \cdot \cos(b)}{\tan(2 \cdot d)} + \frac{l^2 \cos^2(b)}{\tan^2(2 \cdot d)} = \frac{l^2 \cos^2(b)}{\sin^2(2 \cdot d)}$$

$$\sin^2(P) + \sin^2(b) \cdot \cos^2(P) + \frac{2 \cdot \sin(b) \cdot (-\tan(b) \cdot \tan(d)) \cdot \cos(b)}{\tan(2 \cdot d)} + \frac{\cos^2(b) \cdot \cos^2(2 \cdot d)}{\sin^2(2 \cdot d)} - \frac{\cos^2(b)}{\sin^2(2 \cdot d)} = 0$$

$$\sin^2(P) + \sin^2(b) \cdot \cos^2(P) - \frac{2 \cdot \cos(2 \cdot d) \cdot \sin(b) \cdot \sin(b) \cdot \sin(d) \cdot \cos(b)}{\sin(2 \cdot d) \cdot \cos(b) \cdot \cos(d)} + \frac{\cos^2(b)}{\sin^2(2 \cdot d)} \cdot (\cos^2(2 \cdot d) - 1) = 0$$

$$\sin^2(P) + \sin^2(b) \cdot \cos^2(P) - \frac{2 \cdot \cos(2 \cdot d) \cdot \sin^2(b) \cdot \sin(d) \cdot \cos(b)}{2 \cdot \sin(d) \cdot \cos(d) \cdot \cos(b) \cdot \cos(d)} + \frac{\cos^2(b) \cdot (-\sin^2(2 \cdot d))}{\sin^2(2 \cdot d)} = 0$$

$$\sin^2(P) + \sin^2(b) \cdot (-\tan(b) \cdot \tan(d))^2 - \frac{\cos(2 \cdot d) \cdot \sin^2(b)}{\cos(d) \cdot \cos(d)} - \cos^2(b) = 0$$

$$\sin^2(P) + \sin^2(b) \cdot \frac{\sin^2(b) \cdot \sin^2(d)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)} - \frac{(\cos^2(d) - \sin^2(d)) \cdot \sin^2(b)}{\cos^2(d)} - \cos^2(b) = 0$$

$$\sin^2(P) + \frac{\sin^4(b) \cdot \sin^2(d)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)} - \frac{\cos^2(d) \cdot \sin^2(b) - \sin^2(d) \cdot \sin^2(b)}{\cos^2(d)} - \cos^2(b) = 0$$

$$\sin^2(P) + \frac{\sin^4(b) \cdot \sin^2(d)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)} - \frac{\cos^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b) - \sin^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)} - \cos^2(b) = 0$$

$$\sin^2(P) - \frac{\cos^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b) - \sin^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b) - \sin^4(b) \cdot \sin^2(d)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)} - \cos^2(b) = 0$$

$$\sin^2(P) - \frac{\cos^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)} + \frac{\sin^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b) + \sin^4(b) \cdot \sin^2(d)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)} - \cos^2(b) = 0$$

$$\sin^2(P) - \sin^2(b) + \frac{\sin^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b) + \sin^4(b) \cdot \sin^2(d)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)} - \cos^2(b) = 0$$

$$\sin^2(P) = \sin^2(b) - \frac{\sin^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b) + \sin^4(b) \cdot \sin^2(d)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)} + \cos^2(b)$$

$$\sin^2(P) = 1 - \frac{\sin^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b) + \sin^4(b) \cdot \sin^2(d)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)}$$

$$\sin^2(P) = \frac{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d) - \sin^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot \cos^2(b) - \sin^4(b) \cdot \sin^2(d)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)}$$

## ZONNEWIJZERS

$$\sin^2(P) = \frac{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d) - \sin^2(d) \cdot \sin^2(b) \cdot (\cos^2(b) + \sin^2(b))}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)}$$

$$\sin^2(P) = \frac{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d) - \sin^2(d) \cdot \sin^2(b)}{\cos^2(b) \cdot \cos^2(d)}$$

Dit is inderdaad gelijk aan de formule die gevonden is bovenaan bladzijde 3.

<https://www.vankatwijk.nl/zonnewijzers>

<https://www.vankatwijk.nl/zonnewijzers>